

खेतीको आर्थिक उत्कलन

उत्पादन लगानी प्रति हेक्टर एक लाख टुट्टु हजार र्खिया पर्देर र एक वर्षको अन्तरालमा सकलत गरिएको कच्चा-पचापको मुल्य दुई लाख टुट्टु हजार र्खिया पर्देर । यसरी हिमाच बार्ब कृषु नापा इड हजार र्खिया प्रति बार्ब प्रति हेक्टर पाइएको र् ।

खेती तथा सफलन समय तापिका फूल चुन्ने समय : चैत-बैशाख फाल्ने समय : वैशाख-जेठ

नमिनमुनिको काठको कटिड : गमिर-गुप

रोप्ने समय : जेठ-उसार

सकलन समय : असोज-कातिक

विडु १.ने समय : फागुन-चैत



प्राकृतिक बायस्वानबाइ सकलन गर्दा अपनाउनु पर्ने निबन्ध

बुज्याइत

बन निपवाकनी २०११, खैरचोइ तील र खीची सरोधान

निपवाकनी २०१२ खोइजिम मुगन्धबालको जलको

राजन्व र्. १५ प्रति खे.डी. तीर्नु कर्ब

आधिकारिक सिकारा

मुगन्धबालको सकलन अनुमति, राजन्व सकलनका कचचा तथा इजोडिंग उत्पादनको लागि निम्नानुसारको सरकारी निबन्धन परिचालित हुनु ।

क.न. खासरो विवरण आधिकारिक निबन्ध

१. सकलन अनुमति बन विधान, सञ्चालनिक बन उपभोक्ता समूह
२. राजन्व सकलन बन विधान, सामुदायिक बन उपभोग समूह
३. छोड पुर्ती बन विधान
४. स्थानीय कर जिल्ला विफल सचिबि
५. उद्यमको प्रमातपन नेपाल उद्योग करिउप महासघ
६. उत्पादन प्रमातपन वनस्ती विधान र बन विधान
७. निपतिको प्रमातपन उद्योग विधान
८. निपति हुल्क बन्दाइ कार्यालय



मुगन्धबालको असुल खेती तथा संकलन अभ्यास

तानव्युतिक पहिचान

वैज्ञानिक नाम: ध्यालेरियाना जटमन्सी जोन (Valeriana jatamansi Jones.) परिवार: ध्यालेरियासेसी (Valerianaceae) अन्य नाम: इन्डियन ध्यालेराइड, ध्यालेराइड, घमकन्, स्थानीय नाम: सबायो, मुगन्धबाल, नमकली जटमन्सी, निपबन्दी, निपवनी, तागरा, तगर (संस्कृत)

प्रयोग हुने भाग: जरा, काठ, पात

औषधीय प्रयोग

यसलाई हिन्दुरिया निको चान, स्नायु पुवावी मुधान र वेदेको बायु समन गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ । यसबाइ वन्ने औषधिमा आलेपोइइइ नामक रसाघन पाइन्छ जुन इरिन्डोइइका मोनोडिपिनिक सङ्घु भिष परेइ । यसलाई दुबाइ कम गर्ने औषधि मधोकोमोइ जन्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा भएको कुङ्कुमिन भन्ने रसाघनले सुनिने कम गरे । यसमा भएको अन्कालोइइले डोडु निको चान, निम्डा मनाउने, डारे रोव, रक्तघातलाई डिक चान र उदासीपन निको चान सहयोग गरेइ ।




अन्तरप्रयोग

यसको जसमा करीव ०.५५५ तेल हुन्छ । यो सुगन्धित हुनामे सौन्दर्य प्रलाभनहने स्नायु, सेप, आदि वनाउन प्रयोग गरिन्छ । अन्तरवती बसला घुपहक बनाउनु पनि यसको प्रयोग हुन्छ । यसको पातको तरकारी खाने पनि गरिन्छ ।



पदिदिसवतीय तिको घना र उत्पादन क्षेत्र

यो प्रजाति अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, चीन र म्यान्मारको हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ । नेपालको उचोपर्वदेखि शीतोष्ण क्षेत्रका इच्छाप्रपक ३ मी सम्मको उचाईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा पाइन्छ । मुगन्धबाल बहुवर्षीय धार बरबको वनस्पति हो जुन जवतका ई उडाउक सकिना खुला खैरकका, बारीक कान्ताहरूमा उमिन्छ । हल्का बर्षी र मलिनो कर्दीमा यो वनस्पति सकिने हुमिन्छ । भोघर, कडुन, वेल्तो, कुडियो, गोबे सल्ला, लेखाइो, बन्नु, गुराब, र्दैनो, आदिको जंगनमा यो प्रजाति प्रचलत पाइन्छ ।



स्रोत: ESON, 2009

नेपालमा उपलब्धता

नेपालका मध्य पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका खडबन्नाहरूमा यो वनस्पति भोइएको र् । ती जिल्लाहरू बाबुन्दा, बैतडी, दडेन्चुवा, हुम्ला, बन्हाड, खोरी, बाजुरा, अर्खान, मुगु, कुन्दा, कालिकोटे, देबेड, दोला, जाजरकोटे, रुकुम, सुर्खेत, सल्यान, रोल्पा, प्युलन, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जी, कुन्मी, गोरखा, अर्खोखोपी, लमजुङ, काल्की, बर्षत, स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, बाइ, रतुवा, नुवाकोटे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काल्जाङ, भक्तपुर, खलिनपुर, मकवानपुर, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, खोल्हाङ्ग, खोल्हाङ्ग, खोल्हाङ्ग, उदयपुर, भोजपुर, सञ्चुखाम्भा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम हुन् ।

तानव्युतिक विवरण

यो बहुवर्षीय धार बरबको वनस्पति हो । करीव डेढेडडे न मी, बसलो हुने यो बिरुवाको जमिनमुनिको काठ ३ डडे से मी, लामो र र् से मी सम्म मोइो हुन्छ । फलतिरको पातको लोड मुद्, अकारको र् डडे से मी, लामो हुन्छ । पातको ई उ शोती परेको र र् मेर खीएको हुन्छ । पातको माथिल्लो पादात्ता रौतक हुन्छन् । एउदे फूलका आले र खोपी हुन्छ र र् डडे से मी, लामो फूलको काठका मुजमुज परेर चुल्केक हुन्छन् । फूलको रग हल्का रातो वा सेतो हुन्छ । फूल ड मि.मि. लामो हुन्छ, जसको अन्त-अन्त मोसिना भुवाघार रेसा पलाएको हुन्छ । मड-म मि.मि. लामो पत्ररलको दुयो चुल्को परेको हुन्छ । पुकेधर प बडा काज भएको हुन्छ । फल सेरो मसिना बढ्दकल र् डडे मि.मि. लामो र ड मि.मि. खोटा रौतकले ढाकिएको हुन्छ । जमिनमुनिको काठ तेसो परेको र केही मोइो हुन्छ । जसबाइ मुद्मुन्क परेका जराहरू जमिनमुनि गाडिएका हुन्छन् । फललाई बिचलको भुजाजन्नी सेतो रेसाहरूले ढाकेका हुन्छन् ।

औषधीय भागको गुणहरू

कुकेका जमिनमुनिको काठ वेतनाकर र केही शुपिएको हुन्छ । यो ड देडि ड से मी सम्म लामो र ड देडि ड मि.मि.सम्म खोटा हुन्छ । बसला काठका, शुपे मसिना जराहरू पलाएका हुन्छन् । तिनीहरू र् देडि ड से मी सम्म लामो र र् ड देडि ड मि.मि.सम्म मोइो हुन्छन् । काठको करिपरी पुला पात र जराका दोहाक सार्थ, देडिङ्गन । बाहिरबाइ हेर्दा गांध सेरो र कर्देर भिष हेर्दा हल्का सेरो परेका हुन्छन् । अड सुंवा सकिने बासा आउरे, र स्याड तिरो हुन्छ ।



निपवाकनी ध्यालेरियाना तिको मुगन्धबाल पाउने स्थानमा पाइन्छ र योलेनदे मिमलउने रविन र्, तर यो मिमलउता हुनेन ।